ACTUALITES
RIPHH SUD CORSE

23 Janvier 2014

F.de PERETTI

Formation en ligne "Voie sous-cutanée"

- Le CC lin et les Arlin de l'inter-région Sud-est mettent à la disposition des professionnels des établissements de santé et médico-sociaux ainsi que des instituts de formation, **un outil de formation en ligne avec vidéo** (30 minutes de formation) ainsi que **des documents téléchargeables** [fiches pratique, de suivi, diaporama de formation et vidéo].

- http://cclin-sudest.ch-lyon.fr/formationenligne/cvp/cvp.html

- **Le cathétérisme périphérique : un geste sûr pour le patient et le soignant**

Sécuriser pour prévenir

Comment améliorer la prescription et les bonnes pratiques de prélèvement des hémocultures ?

. Le CC lin et les Arlin de l'inter-région Sud-est mettent à la disposition des professionnels des établissements de santé et médico-sociaux, des laboratoires d'analyses médicales ainsi que des IFCS, **un outil de formation en ligne avec vidéo** (30 minutes de formation) ainsi que **des documents téléchargeables** fiche pratique, 2 diaporamas de formation.

- Cet outil de formation comprend 1 module sur la prescription et 1 module sur le prélèvement des hémocultures.

Vous trouverez un diaporama de présentation du projet qui peut vous permettre de communiquer sur le projet au sein de votre établissement.

Nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi pour créer votre compte d'accès à l'outil de formation.

Si vous souhaitez utiliser plusieurs fois la formation, vous devez demander un accès "formateur" auprès de Me Urtikova par mail nataliya_urtikova@europe.bd.com

- Le lien vers la plateforme de formation en ligne est le suivant : http://bd.elmg.net/ets/content/home.php?changelang=fr

- *NOTE TECHNIQUE DE LA COMMISSION DÉSINFECTION DE LA SF2H* – Indications des lingettes en désinfection dans le domaine médical – NOVEMBRE 2013

- *RECOMMANDATIONS : GESTION PRÉOPÉRATOIRE DU RISQUE INFECTIEUX* Mise à jour de la conférence de consensus – OCTOBRE 2013

- *TRANSMISSION CROISÉE* : ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION POUR UNE ANALYSE DE RISQUE – JUILLET 2013

- *POINT SUR LES NORMES DE SPORICIDIE* – JUIN 2013

- *INFORMATION SUR LES MESURES D'HYGIÈNE VIS-À-VIS DES VIRUS RESPIRATOIRES ÉMERGENTS* – MAI 2013

- *RECOMMANDATIONS NATIONALES : PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION CROISÈE PAR VOIE RESPIRATOIRE : AIR OU GOUTTELETTES* – MARS 2013

- *RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES : PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX CHAMBRES À CATHÉTER IMPLANTABLES POUR ACCÈS VEINEUX* – MARS 2012 / JANVIER 2013

Le prochain congrès annuel de la SF2H se déroulera à Marseille les 4, 5 et 6 juin 2014.

SF2H
Risque infectieux et soins

Préconisations d'hygiène en radiologie interventionnelle - décembre 2012

- Classification des actes

- Classification des différentes qualités microbiologiques requises en fonction du site anatomique.

➔12 préconisations
➔51 références bibliographiques

CCLIN SUD EST

- Formations en ligne sur le site du CC lin Sud-est : cathétérisme périphérique (CVP et voie sous-cutanée) et hémoculture
  [Présentation] des outils mis à votre disposition

  DIALIN Dialien n°5 – Journée d'échanges le 7 octobre 2014
  ISO Sud-est Journée d'échanges le 7 avril 2014
  MATER Journée d'échanges le 16 octobre 2014

- http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/eau.html
- http://nosobase.chu-Lyon.fr/recommandations/vaccination.html
- http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/tuberculose.html

Découvrez Mobiqual

- Mobiqual "Risque infectieux" (outil dématérialisé) s'inscrit dans le cadre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social

- Le contenu du site est accessible aux **professionnels des EHPAD** avec ou sans connexion Internet. Elle vous est nécessaire pour accéder aux mises à jour et aux liens externes.
  Avec une **information adaptée à chaque métier**, elle compte **6 index thématiques** (infections respiratoires basses, urinaires, digestives et cutanées, les BMR, et le risque épidémique).

- Une navigation existe par métier et par mots clés ainsi qu'une mise à disposition de ressources documentaires et d'outils de formation (diaporamas, vidéos, cas cliniques, fiches pratiques…).

- Pour accéder à ce site et au programme, vous devez en faire la demande à la SFGG **à partir du 2 janvier 2014** .

http://www.mobiqual.org/outils/risques-infectieux/

LES OUTILS MOBIQUAL

- Supports interactifs
- Multi-usages : Formation, EPP, remise à niveau des connaissances…
- Facilité d'utilisation
- Référence aux recommandations
- Catalogue des outils validés

GREPHH

GROUPE D'ÉVALUATION DES PRATIQUES EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Risque infectieux en FAM MAS

Il s'agit de l'adaptation du manuel d'autoévaluation du GREPHH sur la maîtrise du risque infectieux en EHPAD pour le secteur des Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) et des Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM).

L'outil construit par le GREPHH avec l'aide de professionnels de FAM et de MAS a pour objectif de dégager des points forts et des points à améliorer de l'établissement dans la prévention des infections associées aux soins.

L'outil vous permet l'élaboration d'un plan d'action précis et spécifique à l'établissement.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une politique globale d'amélioration continue de la qualité.

Des fiches pratiques d'accompagnement du manuel d'auto-évaluation du risque infectieux sont proposées aux EHPAD. Elles peuvent vous être utiles dans le cadre de votre démarche d'analyse de risque.

Circulaire interministérielle du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011/2013

Quelques info !

- **Notez la date !**
  La **prochaine Journée annuelle Sud-Est** des acteurs de la LIN aura lieu le **20 mars 2014 à Lyon**. Nous vous attendons nombreux à cette journée annuelle réunissant les acteurs de la LIN de l'inter-région Sud-Est et tous les professionnels concernés par l'hygiène ! Programme et inscription à venir
- **Inscriptions aux surveillances 2014**
  Préparez le programme de surveillance de votre établissement pour l'année prochaine.
  [Annonce][Modalités de surveillances]
  N'oubliez pas de vous procurer la version 2014 de la documentation spécifique de chacun des réseaux car les protocoles et les outils informatiques sont régulièrement actualisés.
  Ils sont téléchargeables dans la rubrique [Surveiller] du site du CClin Sud-Est. Bonne surveillance à tous

- **Révisez la grippe en quelques clics !**
  A l'occasion de la semaine sécurité des patients et juste avant la saison grippale 2013-2014, le CClin Sud-Ouest propose aux professionnels de santé un jeu sérieux ou *serious game* intitulé **Grippe.0**.
  Disponible en ligne ou téléchargeable, cet outil permet en 10 min de reprendre les principales mesures pour assurer une bonne gestion de la saison grippale dans nos établissements de santé

- **Enquête de la SPILF sur la prescription antibiotique SPA5 ou AMI-SPA**
  La SPILF et l'ONERBA vous proposent de participer à la 5e enquête de surveillance de la prescription des antibiotique SPA5 ou AMI-SPA centrée sur la prescription des aminosides dans les établissements de santé. L'objectif majeur est d'évaluer l'application des recommandations nationales suite à la publication du référentiel de l'AFSSAPS en 2011.
  Pour en savoir plus et participer, consultez le site de la SPIL
- **Audit précautions complémentaires (PC) du Grephh**
  Suite à l'audit national précautions standard (PS) proposé en 2011, le Grephh, groupe de travail inter-CClin, a élaboré un nouvel outil d'évaluation sur les précautions complémentaires d'hygiène de type : contact (PCC), gouttelettes (PCG) et air (PCA).
  Des critères précisent l'organisation des soins, les moyens mis à disposition dans les services, l'environnement du patient et la connaissance des PC par les professionnels. Un critère spécifique développe les conditions d'élimination des excreta en raison de l'actualité liée à la diffusion des entérobactéries productrices de β-lactamase à spectre étendu (EBLSE).
  Premier audit Web, cet outil "clé en main" est mis à disposition des établissements de santé et médico-sociaux dans sa version papier pour l'instant. L'accès et l'inscription à l'application WebAPC seront disponibles dans un second temps, fin janvier 2014. Vous pouvez y accéder par le site du [CClin Sud-Est] ou le site du [Grephh].
  Pour accompagner le programme [StopRisk+], **les établissements de l'inter-région Sud-Est qui réalisent l'audit durant l'année 2014 verront leurs données analysées dans un rapport commun inter-régional Sud-Est.**

Publications / Recommandations

- Hygiène et gestion du risque infectieux en psychiatrie. Décembre 2013
- NosoVeille n°12. Décembre 2013
- Enquête autour d'un cas de tuberculose. Recommandations pratiques. HCSP, 2013, 95 pages.
- Conduite à tenir pour l'élimination des excreta. CClin Paris-Nord 2013, 2 pages.
- Note technique de la commission Désinfection de la SF2H : indications des lingettes en désinfection dans le domaine médical. SF2H 2013, 5 pages
- Information sur les bactéries multi résistantes (BMR) pour le patient et sa famille. Arlin Nord Pas de Calais, ARS Nord Pas de Calais, CISS, URPS. 2013, 2 pages.
- Précautions spécifiques BHRe (Patients infectés ou colonisés). CClin Ouest. 2013, 2 pages.
- Gestion préopératoire du risque infectieux. Mise à jour de la conférence de consensus. SF2H. 2013, 112 pages.
- Le patient-traceur en établissement de santé. Méthode d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Version expérimentale. HAS. 2013, 56 pages.
- Tests rapides de diagnostic de la grippe. Ansm. 2013

Alerte BHRe

- Alerte *Klebsiella pneumoniae OXA 48* des régions PACA et Corse
  Au 2 décembre 2013 et depuis septembre 2012, **102 patients** (dont 33 infectés et 69 colonisés) ont été identifiés porteurs de cette entérobactérie productrice de carbapénémases (EPC).
  Au cours de ce dernier mois, on compte 4 nouveaux cas index et 6 cas supplémentaires secondaires.
  La persistance de la survenue de nouveaux cas et la taille de l'épidémie, la plus importante en France, demande l'application stricte et sans délai des [recommandations BHRe] du Haut Conseil de la Santé Publique de juillet 2013.

Règlementation / Officiel

- Arrêté du 18 novembre 2013 fixant le contrat type de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
- Décret n° 2013-923 du 16 octobre 2013 pris pour la transposition de la directive 2012/26/UE du 25 octobre 2012 modifiant en ce qui concerne la pharmacovigilance la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant
- http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/sommaire_reglementation.html

CATHETER CENTRAL
à insertion périphérique





Recommandations

Indications des PICC

CRITÈRES DE CHOIX POUR LES INDICATIONS (HORS NÉONATOLOGIE)

1. Toutes disciplines confondues, un PICC peut être proposé :
- dès qu'un abord veineux fiable d'une durée attendue supérieure ou égale à 7 j consécutifs est nécessaire (à la place d'un accès périphérique), et si la durée du traitement prévue est inférieure ou égale à 3 mois (AF),
- chez l'adulte et l'enfant (AF) (rappel : néonatologie hors cadre de ces recommandations),
- chez un patient atteint de thrombopénie ou de neutropénie (AF),
- chez un patient refusant une CCI ou en cas de contre-indication temporaire d'une CCI (AF),
- chez un adulte ou un enfant traité à domicile (AF).

Il n'y a pas de consensus sur la pose d'un PICC pour assurer les soins péri-opératoires chez un patient déjà porteur d'une CCI (afin de préserver la CCI du risque infectieux).

CRITÈRES DE CHOIX POUR LE MATÉRIEL

2. Si un PICC multilumière n'est pas nécessaire, choisir un PICC monolumière (AF).

3. Avant la mise en place d'un PICC, vérifier que la veine choisie est perméable, compressible et d'un diamètre compatible avec le diamètre du cathéter (AF).

Il n'y a pas de consensus sur la nécessité de vérifier par écho-Doppler la présence d'un flux maximum dans la veine choisie avant la mise en place d'un PICC.

4. Pour prévenir les phénomènes de thrombose veineuse profonde (TVP) et de thrombophlébite superficielle :
- choisir un PICC de diamètre inférieur ou égal au tiers du diamètre de la veine ponctionnée mesuré sous garrot axillaire (AF),
- choisir de préférence pour un PICC monolumière un diamètre inférieur ou égal à 4 Fr (AF), et pour un PICC multilumière un diamètre inférieur ou égal à 5 Fr (AM).

5. Un PICC « haute pression » est indiqué en cas de prévision d'injection de produit de contraste avec une vitesse d'injection de 5 ml/sec (AF).

CRITÈRES DE CHOIX EN CHIRURGIE, ANESTHÉSIE, RÉANIMATION, USI

6. Un PICC peut être proposé :
- à la place d'un CVC en position sous-clavière, jugulaire interne non tunnellisé, et fémoral non tunnellisé (AF),
- chez le patient trachéotomisé, porteur de fistule ou stomie cervicale, à la place d'un CVC jugulaire interne non tunnellisé (AF).

7. Pour éviter les risques mécaniques liés à un abord sous-clavier percutané ou jugulaire interne, un PICC est indiqué chez le patient avec des troubles de l'hémostase (AF).

8. Pour éviter les risques mécaniques liés à un abord sous-clavier percutané, un PICC est indiqué chez le grand insuffisant respiratoire (AF).

Il n'y a pas de consensus sur l'indication d'un PICC chez le grand insuffisant respiratoire pour éviter les risques mécaniques liés à un abord jugulaire interne.

9. La pose d'un PICC n'est pas indiquée en cas de choc nécessitant un remplissage rapide (AF).

10. Dans la prise en charge d'un grand brûlé, un PICC peut être indiqué dès que le patient est en situation hémodynamique stable (AF).

11. Un PICC permet la mesure de la PVC (AF).

Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées.

Les fiches portent sur les points suivants :

- Données épidémiologiques et diagnostiques et les particularités des personnes âgées
- Prévention des IRA en collectivité pour personnes âgées, conduite à tenir devant un cas isolé d'IRA en Ehpad
- Conduite à tenir devant plusieurs cas d'IRA en Ehpad
- Démarche de recherche étiologique.


Haut Conseil de la Santé Publique
Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/geriatrie.html

Survenue de maladies infectieuses dans une collectivité. Conduites à tenir.

Date du document : 28/09/2012. Date de mise en ligne : 27/01/2013

- Chaque maladie infectieuse fait l'objet d'une fiche individuelle (période d'incubation, durée de la contagiosité, mesures à prendre concernant l'éviction du sujet malade, l'hygiène et la prévention de l'entourage).
- Les dispositions prévues s'appliquent à l'ensemble des collectivités. Le cas échéant, les mesures de contrôle recommandées ont été adaptées aux types de collectivités.
- Ce guide s'adresse aux médecins traitants, aux médecins des collectivités qui ont en charge les mesures à prendre en cas de maladies infectieuses en coordination avec les directeurs de collectivité, et aux gestionnaires.

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20120928_maladieinfectieusecollectivite.pdf

Gâle

Date de mise en ligne : 27/01/2013



Haut Conseil de la santé publique

AVIS

relatif à l'actualisation des recommandations sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de gale

9 novembre 2012

- Le HCSP rappelle les caractéristiques cliniques de la gale, fait le point sur les techniques diagnostiques et sur les TTT
- Il recommande que :
  - les conditions de Δg de la gale soient précisées
  - le TTT individuel puisse être rediscuté
  - les TTT locaux soient remboursés
  - le TTT par la perméthrine topique soit mis à disposition.
- Le HCSP précise les modalités de TTT
  - de l'entourage du cas index,
  - du linge, de la literie et de l'environnement.
- Pour la gale hyperkératosique : le HCSP recommande le TTT en milieu spécialisé.

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/hcsp/2012_gale.pdf

Check-list

«sécurité du patient en endoscopie digestive»

CHECK-LIST
« SÉCURITÉ DU PATIENT
EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE »
Version 2013

AVANT L'ENDOSCOPIE

APRÈS L'ENDOSCOPIE

HAS

SFED

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1357134/check-list-securite-du-patient-en-endoscopie-digestive

Suite à l'évolution récente des recommandations visant à réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels lors des actes invasifs, le CNPHGE (Conseil National Professionnel des Hépato-Gastro-Entérologues) et la SFED (Société Française d'Endoscopie Digestive) ont souhaité faire évoluer la Check-list "Sécurité du patient en Endoscopie" afin de prendre en compte cette actualisation. La HAS met à votre disposition ce nouveau format 2013 qui a également été validé par la SF2H.

Guide de l'HAD



http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Doc_Reco/HAD.html

Préface 3

Participants 4

Sigles et abréviations 6

Introduction 7

Les essentiels 9

CHAPITRE I
Risque infectieux en HAD 13

CHAPITRE II
Stratégie de la prévention du risque infectieux 17

CHAPITRE III
Hygiène et organisation des soins 23

Annexe I - Rites mortuaires 31

CHAPITRE IV
Logistique 33

Annexe II - Exemple de cahier des charges « Prestataires » 39

Annexe III - Exemple d'audit « Prestataires » 46

CHAPITRE V
Prévention du risque infectieux chez les professionnels 53

CHAPITRE VI
Gestion des déchets d'activités de soins 57

CHAPITRE VII
Éducation des patients et des aidants 63

Annexe IV - Exemple d'un outil d'aide à la réalisation du diagnostic éducatif 68

Annexe V - Exemples de grille d'évaluation de pratiques 69

Pour les EHPAD

- La **version N° 2** va paraître avec :
  - des fiches complémentaires
  - possibilité d'importation du document.

Surveillance

CCLin Sud Est

Université Claude Bernard Lyon 1

L'offre de DPC

Formation 2014

CClin-Arlin Sud-Est

Prévention du risque infectieux associé aux soins & hygiène hospitalière

Bilan 2013 : campagnes, outils, CClin-Arlin Sud-Est

En cette fin d'année, l'heure du bilan est arrivée…
Cette année fut riche en nouveautés : de StopRisk Plus aux outils de formation en ligne, nous fûmes, vous et nous bien occupés.

186 établissements se sont inscrits au programme de sensibilisation StopRisk Plus (précautions complémentaires Contact, Gouttelettes, Air) depuis sa mise en ligne (juin 2013), et 3 établissements ont validé ce programme en renvoyant les résultats de l'enquête (fichier Excel). Une analyse inter-régionale sera réalisée dès réception de vos résultats.

Depuis 2009, 554 établissements engagés dans le programme d'action StopRisk (Précautions standard) dont 219 ont validé leurs actions en nous adressant un questionnaire d'évaluation, soit une participation de plus de 20 000 professionnels et plus de 4 000 usagers.

Des mains propres, un soin plus sûr. *"Je sais pourquoi, je sais quand, je sais comment, je m'engage et vous ?"*
En 2012, nous avons lancé une campagne "hygiène des mains" lors de la semaine de sécurité du patient, avec un envoi aux 3 350 établissements sanitaires et médico-sociaux (EHPAD, FAM, MAS) suivi d'un envoi sur commande dès mars 2013 pour la journée Mission mains propres. Depuis, 148 établissements ont pu bénéficier d'un nouvel envoi et ainsi apparaître comme établissements engagés sur notre site.

910 personnes se sont inscrites pour la formation en ligne **Cathéter sous-cutané**.
La formation **Cathéter veineux périphérique** sera disponible mi-janvier 2014.

Concernant la formation **Hémoculture**, disponible début décembre 2013, il y avait déjà 84 inscrits (45 pour le module Préleveur, 2 pour le module Prescripteur et 37 pour les deux modules), avec une majorité de CH mais aussi des EHPAD et des IFCS.

Tous ces outils, programmes, campagne, sont gratuits, ils sont faits pour vous, pour les professionnels de terrain et les usagers et demeurent disponibles.
L'année 2014 sera dans cette même continuité, dynamique, riche grâce à l'implication de tous !

Vous avez désormais un accès direct

à l'ensemble des productions du réseau Cclin-Arlin

Site CCLIN-ARLIN : http://www.cclin-arlin.fr/

CC lin sud-est
Hôpital H. Gabrielle
20 route de Vourles
69230 Saint Genis-Laval
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr

AR lin Corse
Centre hospitalier d'Ajaccio
Site Hôpital Eugénie
1 rue Colomba
20000 AJACCIO
Tél : 04 95 29 67 30
arlin.corse@ch-ajaccio.fr

ARlin Corse

Merci de votre attention